

Richtlijnen om zo efficiënt en veilig mogelijk te vaccineren



Bewaring van vaccins

- ✓ Werk alleen met vaccins die in het donker en koel vervoerd en bewaard zijn geweest (2 - 8 °C).
 - ⇒ Bevriezing beschadigt het vaccin. Hierdoor zal de effectiviteit sterk verminderen.

Toedienen van vaccins

- ✓ Laat het vaccin op kamertemperatuur komen of warm de flacons met behulp van handwarm water op voordat u begint te vaccineren.
- ✓ Schud het vaccin licht voor gebruik zodat de suspensie gehomogeniseerd wordt.
- ✓ Voer bij een nieuw geleverd vaccin steeds een proefvaccinatie uit op vijftal dieren.
 - ⇒ Controleer op anafylactische shock.
 - ⇒ Houd dieren een vijftal dagen in het oog; controleer op eventuele reacties.
- ✓ Een aangebroken flacon moet binnen 8 uur opgebruikt worden; is het vaccin niet volledig opgebruikt, behandel aangebroken flacons als chemisch afval en bewaar ze niet.
 - ⇒ Aangebroken flacons raken snel gecontamineerd en gebruik ervan kan bij dieren ernstige symptomen veroorzaken.
- ✓ Vaccineer alleen gezonde dieren.
- ✓ Stress heeft een negatief effect op de opbouw van afweer, probeer daarom stress factoren zoveel mogelijk uit te schakelen.
 - ⇒ Probeer niet te vaccineren op momenten zoals spenen of hergroeperen.
 - ⇒ Gebruik scherpe naalden.
 - ⇒ Gebruik naalden van geschikte lengte en dikte.
 - ⇒ Ga rustig met de dieren om.
 - ⇒ Neem de tijd om de dieren op de correcte plaats te injecteren.
- ✓ Vermijd het gecombineerd of gemengd gebruik van vaccins.
 - ⇒ Gemengd toedienen van vaccins kan resulteren in verminderde efficiëntie.
- ✓ Houd u aan het geadviseerde vaccinatieschema.

Reinigen van het materiaal

- ✓ Zorg voor een goede hygiëne van de injectiespuiten.
 - ⇒ Demonteer de spuiten na het injecteren.
 - ⇒ Reinig al de onderdelen door ze te spoelen met warm water of door ze uit te koken.
 - ⇒ Gebruik bij voorkeur geen desinfectiemiddel. Restanten van zeep of desinfectantia kunnen de werking van het vaccin negatief beïnvloeden.
 - ⇒ Bewaar ze, na reiniging, in een koele omgeving zoals in de koelkast.
 - ⇒ Vervang injectiespuiten ook af en toe. Slijtage kan ervoor zorgen dat de spuiten niet goed meer gereinigd kunnen worden.
- ✓ Vervang injectienaalden regelmatig op strategische momenten, bijvoorbeeld na elk hok of na elke diercategorie, dit om verspreiding van ziekteverwekkers tussen dieren te voorkomen.