

Guidelines pour une vaccination sûre et efficace



Conservation du vaccin

- ✓ Travailler uniquement avec des vaccins qui ont été transportés et stockés dans un environnement sombre et frais (2 - 8 °C).
 - ⇨ La congélation endommagera le vaccin. Cela réduira l'efficacité.

Administration de vaccins

- ✓ Laisser le vaccin atteindre la température ambiante ou réchauffer les flacons avec de l'eau tiède avant commencer la vaccination.
- ✓ Agitez doucement le vaccin avant utilisation pour homogénéiser la suspension.
- ✓ Avec un vaccin nouvellement délivré, effectuez toujours un test de vaccination sur cinq animaux.
 - ⇨ Vérifiez un potentiel choc anaphylactique.
 - ⇨ Gardez un œil sur les animaux pendant cinq jours; vérifiez les réponses.
- ✓ Le flacon une fois ouvert doit être utilisé dans les 8 heures; si le vaccin n'a pas été utilisé complètement, traitez les bouteilles ouvertes comme des déchets chimiques et ne les conservez pas.
 - ⇨ Les flacons ouverts deviennent rapidement contaminés et leur utilisation peut provoquer des symptômes graves chez les animaux.
- ✓ Vaccinez les animaux sains uniquement.
- ✓ Le stress a un effet négatif sur la constitution de l'immunité, essayez donc d'éliminer autant que possible les facteurs de stress.
 - ⇨ N'essayez pas de vacciner à des moments comme le sevrage ou le regroupement.
 - ⇨ Utilisez des aiguilles pointues.
 - ⇨ Utilisez des aiguilles de longueur et d'épaisseur appropriées.
 - ⇨ Soyez doux avec les animaux.
 - ⇨ Prenez le temps d'injecter les animaux à l'endroit adéquat.
- ✓ Évitez l'utilisation combinée ou mixte
 - ⇨ L'administration mixte de vaccins peut réduire l'efficacité.
- ✓ Respectez le calendrier de vaccination recommandé.

Nettoyage du matériel

- ✓ Assurer une bonne hygiène des seringues.
 - ⇨ Démontez les seringues après l'injection.
 - ⇨ Nettoyez toutes les pièces en les rinçant à l'eau tiède ou en les faisant bouillir.
 - ⇨ N'utilisez pas de préférence des désinfectants. Des restes de savon ou de désinfectants peuvent affecter le vaccin.
 - ⇨ Après le nettoyage, conservez-les dans un environnement frais, comme au réfrigérateur.
 - ⇨ Remplacez les seringues de temps en temps. L'usure peut empêcher le nettoyage correct des seringues.
- ✓ Remplacez régulièrement les aiguilles d'injection à des moments importants, par exemple après chaque groupe ou après chaque type d'animaux, pour éviter la propagation d'agents pathogènes entre les animaux.

Pour plus d'informations :

Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX Raamsdonksveer - Pays-Bas
Belgique : Philippe Broers +32 496 527404 - belgium@dopharma.com - www.dopharma.be