

Wytyczne zapewniające możliwie największą skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzanych szczepień



Przechowywanie szczepionek

- ✓ Należy stosować wyłącznie takie szczepionki, które były transportowane i przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu (2 - 8° C).
 - ⇒ Zamrożenie powoduje uszkodzenie szczepionki i zmniejszenie jej skuteczności.

Podawanie szczepionek

- ✓ Do szczepienia należy przystąpić, kiedy szczepionka osiągnie temperaturę pokojową. Fiolki można również ogrzewać letnią wodą.
- ✓ Przed użyciem należy delikatnie wstrząsnąć szczepionką w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny.
- ✓ W przypadku nowo dostarczonych szczepionek należy przeprowadzić próbne szczepienie na pięciu zwierzętach.
 - ⇒ Należy upewnić się, czy szczepienie nie wywołuje wstrząsu anafilaktycznego.
 - ⇒ Obserwować zwierzęta przez pięć dni pod kątem występowania reakcji poszczepiennych.
- ✓ Otwarte opakowanie należy zużyć w ciągu 8 godzin. Nie należy przechowywać butelek z niewykorzystaną szczepionką - są one klasyfikowane jako odpady chemiczne.
 - ⇒ Otwarte fiolki szybko ulegają zanieczyszczeniu. Używanie takiej szczepionki może spowodować pojawienie się poważnych objawów u zwierząt.
- ✓ Należy szczepić wyłącznie zdrowe zwierzęta.
- ✓ Stres wpływa negatywnie na budowanie odporności, a zatem należy wyeliminować możliwe wszystkie czynniki stresowe.
 - ⇒ Szczepień nie należy przeprowadzać w okresie odsadzania młodych od matki lub przegrupowywania stada.
 - ⇒ Do podawania szczepionek należy używać ostre igły.
 - ⇒ Należy zapewnić odpowiednią długość i grubość stosowanych igieł.
 - ⇒ Ze zwierzętami należy postępować w sposób łagodny.
 - ⇒ Przy iniekcji należy unikać pośpiechu, aby włączyć się we właściwym miejscu.
- ✓ Należy unikać łączenia lub mieszania szczepionek.
 - ⇒ Podanie mieszaniny szczepionek może obniżyć ich skuteczność.
- ✓ Należy przestrzegać zalecanego kalendarza szczepień.

Odpowiednie czyszczenie materiału

- ✓ Należy zapewnić odpowiednią higienę strzykawek.
 - ⇒ Po iniekcji rozebrać strzykawki na części.
 - ⇒ Wszystkie części przepłukać ciepłą wodą lub wygotować.
 - ⇒ Unikać stosowania środków dezynfekujących. Pozostałości mydła lub środków odkażających mogą wpływać na działanie szczepionki.
 - ⇒ Umyte strzykawki przechowywać w chłodnym miejscu, np. w lodówce.
 - ⇒ Strzykawki wymagają okresowej wymiany. Zużycie uniemożliwia ich prawidłowe czyszczenie.
- ✓ Należy regularnie wymieniać igły iniekcyjne w strategicznych momentach, na przykład po zaszczepieniu każdej zagrody lub kategorii zwierząt, co zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów między zwierzętami.