

Ghid pentru vaccinarea cât mai eficientă și sigură posibil



Depozitarea vaccinurilor

- ✓ Lucrați numai cu vaccinuri care au fost transportate și depozitate într-un mediu întunecat și răcoros (2 - 8 °C).
 - ⇒ Congelarea va deteriora vaccinul. Acest lucru va reduce eficacitatea.



Administrarea vaccinurilor

- ✓ Lăsați vaccinul să atingă temperatura camerei sau încălziți flacoanele cu apă caldă înainte de a începe vaccinarea.
- ✓ Agitați ușor vaccinul înainte de utilizare pentru a omogeniza suspensia.
- ✓ Cu un vaccin nou furnizat, efectuați întotdeauna o vaccinare de test pe cinci animale.
 - ⇒ Verificați dacă apare șocul anafilactic.
 - ⇒ Supravegheați animalele timp de cinci zile; verificați dacă există reacții.
- ✓ Odată deschis, utilizați în termen de 8 ore; dacă vaccinul nu a fost utilizat complet, tratați flacoanele deschise ca deșeuri chimice și nu le păstrați.
 - ⇒ Flacoanele deschise se contaminatează rapid și utilizarea acestora poate provoca simptome grave la animale.
- ✓ Vacinați numai animalele sănătoase.
- ✓ Stresul are un efect negativ asupra dezvoltării imunității, prin urmare încercați să eliminați factorii de stres cât mai mult posibil.
 - ⇒ Nu încercați să vă vaccinați în momente precum în arcarea sau regrouparea.
 - ⇒ Folosiți ace ascuțite.
 - ⇒ Folosiți ace de lungime și grosime adecvate.
 - ⇒ Fiți blând cu animalele.
 - ⇒ Luați-vă timpul necesar pentru a injecta animalele în locul corect.
- ✓ Evitați utilizarea combinată sau mixtă a vaccinurilor.
 - ⇒ Administrarea mixtă a vaccinurilor poate duce la o eficiență redusă.
- ✓ Respectați programul de vaccinare recomandat.



Curățarea echipamentului

- ✓ Asigurați o igienă bună a seringilor.
 - ⇒ Dezasamblați seringile după injectare.
 - ⇒ Curățați toate piesele clătindu-le cu apă caldă sau fierbându-le.
 - ⇒ De preferat să nu folosiți dezinfectanți. Resturile de săpun sau dezinfectanți pot afecta modul în care funcționează vaccinul.
 - ⇒ După curățare, păstrați-le într-un mediu răcoros, cum ar fi la frigider.
 - ⇒ Înlocuiți seringile din când în când. Uzura poate împiedica curățarea corectă a seringilor.
- ✓ Înlocuiți regulat ace de injecție în momente strategice, de exemplu după fiecare arc sau după fiecare categorie de animale, pentru a preveni răspândirea agenților patogeni între animale.